


PROGRAMA ALIMENTAR NUTRIPISCIS AMAZÔNIA CARNÍVOROS

% Alimento conforme indicado na tabela



33°C - 0%
 32°C - 100%
 31°C - 100%
 30°C - 100%
 29°C - 100%
 28°C - 100%
 26°C - 100%
 24°C - 80%
 22°C - 50%
 20°C - 35%
 18°C - 30%

Valores variam de acordo com condições ambientais e/ou sistemas de cultivos.



AL55
farelado

STARTER
0,8/1,5 mm 1,8 mm

AL45
2,6 mm

Carn. Juv.
3 a 4 mm

Carn. Cresc.
6 a 8 mm

Carn. Term.
10 mm


PROTEINA BRUTA (MÍN) (%)	55	45	45	45	42	38	38
UMIDADE (MÁX) %	10	13	12	10	10	10	10
EXTRATO ETÉREO (MÍN) g/Kg	90	90	80	80	120	95	95
MAT. MINERAL (MÁX) g/Kg	200	160	150	150	130	130	130
FIBRA BRUTA (MÁX) g/Kg	40	36	40	40	45	45	45
CÁLCIO (MÁX) g/Kg	40	30	30	30	25	25	25
CÁLCIO (MÍN) g/Kg	25	20	20	20	15	10	10
FOSFORO (MÍN) g/Kg	15	10	10	8	10	10	10
VITAMINA C (MÍN) mg/Kg	600	1500	1000	600	490	490	490

PROGRAMA ALIMENTAR NUTRIPISCIS AMAZÔNIA - ONÍVOROS

% Alimento conforme indicado na tabela



Valores variam de acordo com condições ambientais e/ou sistemas de cultivos.



	AL55 farelado	STARTER 0,8/1,5 mm 1,8 mm		AL45 2,6 mm	Juvenil 3 a 4 mm	Juvenil 6 a 8 mm	Cresc. Equil. 10 mm	Term. Equil. 10 mm
--	------------------	------------------------------	--	----------------	---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

PROTEINA BRUTA (MÍN) (%)	55	45	45	45	36	36	32	28	30	28
UMIDADE (MÁX) %	10	13	12	10	10	10	10	13	10	13
EXTRATO ETÉREO (MÍN) g/Kg	90	90	80	80	70	70	60	40	60	40
MAT. MINERAL (MÁX) g/Kg	200	160	150	150	110	110	110	110	110	110
FIBRA BRUTA (MÁX) g/Kg	40	36	40	40	50	50	50	100	50	100
CÁLCIO (MÁX) g/Kg	40	30	30	30	20	20	20	30	20	30
CÁLCIO (MÍN) g/Kg	25	20	20	20	8	8	8	10	8	10
FOSFORO (MÍN) g/Kg	15	10	10	8	4	4	4	5	4	5
VITAMINA C (MÍN) mg/Kg	600	1500	1000	600	500	500	350	200	300	200


PROGRAMA ALIMENTAR NUTRIPISCIS TC - CARNÍVOROS

% Alimento conforme indicado na tabela



34°C - 0%
 33°C - 50%
 32°C - 100%
 31°C - 100%
 30°C - 100%
 29°C - 100%
 28°C - 100%
 27°C - 90%
 26°C - 90%
 25°C - 80%
 24°C - 80%
 23°C - 50%


Valores variam de acordo com condições ambientais e/ou sistemas de cultivos.
 Referências para peixes carnívoros tropicais.




	AL55 farelado	STARTER 0,8/1,5 mm 1,8 mm	AL45 2,6 mm	TC45 4 mm	TC40 6 a 8 mm	TC40 15 mm
PROTEINA BRUTA (MÍN) (%)	55	45	45	45	40	40
UMIDADE (MÁX) %	10	13	12	10	10	10
EXTRATO ETÉREO (MÍN) g/Kg	90	90	80	80	120	100
MAT. MINERAL (MÁX) g/Kg	200	160	150	150	140	130
FIBRA BRUTA (MÁX) g/Kg	40	36	40	40	45	45
CÁLCIO (MÁX) g/Kg	40	30	30	30	25	25
CÁLCIO (MÍN) g/Kg	25	20	20	20	15	10
FOSFORO (MÍN) g/Kg	15	10	10	8	10	10
VITAMINA C (MÍN) mg/Kg	600	1500	1000	600	600	600

PROGRAMA ALIMENTAR NUTRIPISCIS SI - ONÍVOROS

% Alimento conforme indicado na tabela



Valores variam de acordo com condições ambientais e/ou sistemas de cultivos.



	AL55 farelado	STARTER 0,8/1,5 mm 1,8 mm	AL45 2,6 mm	TR36 3 a 4 mm	SI Cres. 28 6 a 8 mm	SI Cres. 28 10 mm
--	------------------	------------------------------	----------------	------------------	-------------------------	----------------------

PROTEINA BRUTA (MÍN) (%)	55	45	45	45	36	28	28
UMIDADE (MÁX) %	10	13	12	10	10	10	10
EXTRATO ETÉREO (MÍN) g/Kg	90	90	80	80	80	40	40
MAT. MINERAL (MÁX) g/Kg	200	160	150	150	140	140	140
FIBRA BRUTA (MÁX) g/Kg	40	36	40	40	50	100	100
CÁLCIO (MÁX) g/Kg	40	30	30	30	25	30	30
CÁLCIO (MÍN) g/Kg	25	20	20	20	10	15	15
FOSFORO (MÍN) g/Kg	15	10	10	8	6	6	6
VITAMINA C (MÍN) mg/Kg	600	1500	1000	600	350	200	200


PROGRAMA ALIMENTAR NUTRIPISCIS TR - TILÁPIAS

% Alimento conforme indicado na tabela



32°C - 0%
 31°C - 50%
 30°C - 100%
 29°C - 100%
 28°C - 100%
 26°C - 90%
 24°C - 80%
 22°C - 70%
 20°C - 50%
 18°C - 35%
 16°C - 15%
 14°C - 10%
 12°C - 3%

Valores variam de acordo com condições ambientais e/ou sistemas de cultivos.



	AL55 farelado	STARTER 0,8/1,5 mm 1,8 mm		AL45 2,6 mm	AL36	TR36 3 a 4 mm	TR TR TR 32HT 32T 32 4 a 6 mm	TR TR TR 32HT 32T 32 6 a 8 mm	TR TR TR 32HT 32T 32 6 a 8 mm	TR TR TR 32HT 32T 32 6 a 8 mm					
PROTEINA BRUTA (MÍN) (%)	55	45	45	45	36	36	32	32	32	32	32	32			
UMIDADE (MÁX) %	10	13	12	10	13	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10
EXTRATO ETÉREO (MÍN) g/Kg	90	90	80	80	70	80	75	70	60	75	70	60	75	70	60
MAT. MINERAL (MÁX) g/Kg	200	160	150	150	140	140	120	120	130	120	120	130	120	120	130
FIBRA BRUTA (MÁX) g/Kg	40	36	40	40	50	50	45	45	55	45	45	55	45	45	55
CÁLCIO (MÁX) g/Kg	40	30	30	30	25	25	20	20	25	20	20	25	20	20	25
CÁLCIO (MÍN) g/Kg	25	20	20	20	10	10	10	6	6	10	6	6	10	6	6
FOSFORO (MÍN) g/Kg	15	10	10	8	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6
VITAMINA C (MÍN) mg/Kg	600	1500	1000	600	350	350	400	300	300	400	300	300	400	300	300